

口腔洗浄・含嗽剤



ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」

Benzethonium Chloride Gargle liquid 0.2%「KYS」

ベンゼトニウム塩化物製剤

略称

BCガーグル

※診療報酬請求時は裏面記載の販売名(和名)をご記載ください。

保険適用

効能・効果

▶ 口腔内の消毒

■ 投薬の対象例

歯肉炎、口腔創傷、膿瘍切開、歯周外科治療時の口腔内消毒、その他外科的処置後の口腔内消毒など*

▶ 抜歯創の感染予防

■ 投薬の対象例

抜歯後の口腔内消毒*

*保険については各都道府県により判断が異なることがあります。

矯味剤にキシリトールを使用!


使いやすいメジャーカップ付き!



使用方法

▶ 口腔内の消毒の場合


1本(40mL) 5日分*



本剤 **2mL** をメジャーカップではかってください。

▶ 抜歯創の感染予防の場合


1本(40mL) 1~2日分*



本剤 **5~10mL** をメジャーカップではかってください。



① をコップにうつしてください。



コップに水またはぬるま湯(約100mL)を入れて希釈してください。



④ 数回に分けてうがいしてください。

*1日4回、毎食後および寝る前にうがい・洗口する場合

請求点数 (院内投薬)

| | |
|---------|---------------|
| 薬剤料 | 19点 (40mL 1本) |
| 調剤料 | 8点 (処方1回につき) |
| 処方料 | 42点 (処方1回につき) |
| 薬剤情報提供料 | 10点 (月1回) |
| 合計 | 79点 |

*2020年4月現在

うがい薬のみの投薬について

ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」のみの投薬は可能です。

平成26年度の診療報酬改定において、入院中以外の患者に対する治療を目的としないうがい薬のみの投薬は算定できなくなりましたが、本製剤は**対象外**です。

(参考) 平成26年3月31日 厚生労働省保険局医療課事務連絡 疑義解釈資料 医科診療報酬点数表関係 問74

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等は裏面のDIをご参照ください。

ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」

| 製品概要 | 薬効分類名 | 口腔洗浄・含嗽剤 | | 薬効薬理 | <p>1. ベンゼトニウム塩化物は、芽胞のない細菌、真菌類に広く抗菌力をもち、グラム陽性菌には陰性菌より低濃度で効果を示す。^{1)~4)}</p> <p>2. 生物学的同等性</p> <p>円筒平板法による阻止円を指標とした抗菌作用</p> <p>ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」の10倍希釈液及び50倍希釈液は、次の菌種について試験したとき、明確な阻止円が形成され、有意な抗菌作用を示した。また、標準製剤との効力比較の結果、両製剤間に有意差は認められず、両製剤の生物学的同等性が確認された。なお、参考として生理食塩水、試験製剤基剤(ベンゼトニウム塩化物が含有されていないもの)についても同様の操作を実施したが、阻止円は認められなかった。⁵⁾</p> <p>① <i>Staphylococcus aureus</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>50倍希釈</th> <th>10倍希釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」</td> <td>10.10±1.08mm</td> <td>11.39±0.77mm</td> </tr> <tr> <td>標準製剤</td> <td>9.66±0.63mm</td> <td>11.12±0.27mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>② <i>Bacillus subtilis</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>50倍希釈</th> <th>10倍希釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」</td> <td>10.26±0.68mm</td> <td>12.58±0.50mm</td> </tr> <tr> <td>標準製剤</td> <td>10.48±0.33mm</td> <td>13.31±1.25mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ <i>Escherichia coli</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>50倍希釈</th> <th>10倍希釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」</td> <td>9.93±0.73mm</td> <td>11.13±0.90mm</td> </tr> <tr> <td>標準製剤</td> <td>9.91±0.74mm</td> <td>11.07±0.83mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ <i>Candida albicans</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>50倍希釈</th> <th>10倍希釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」</td> <td>阻止円は認められなかった</td> <td>13.42±0.78mm</td> </tr> <tr> <td>標準製剤</td> <td>阻止円は認められなかった</td> <td>13.14±1.41mm</td> </tr> </tbody> </table> | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 10.10±1.08mm | 11.39±0.77mm | 標準製剤 | 9.66±0.63mm | 11.12±0.27mm | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 10.26±0.68mm | 12.58±0.50mm | 標準製剤 | 10.48±0.33mm | 13.31±1.25mm | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 9.93±0.73mm | 11.13±0.90mm | 標準製剤 | 9.91±0.74mm | 11.07±0.83mm | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 阻止円は認められなかった | 13.42±0.78mm | 標準製剤 | 阻止円は認められなかった | 13.14±1.41mm |
|-------------------------|---|---|--------------|------|---|--|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|--|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--|-------|-------|-------------------------|-------------|--------------|------|-------------|--------------|--|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 10.10±1.08mm | 11.39±0.77mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準製剤 | 9.66±0.63mm | 11.12±0.27mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 10.26±0.68mm | 12.58±0.50mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準製剤 | 10.48±0.33mm | 13.31±1.25mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50倍希釈 | 10倍希釈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 9.93±0.73mm | 11.13±0.90mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準製剤 | 9.91±0.74mm | 11.07±0.83mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50倍希釈 | 10倍希釈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | 阻止円は認められなかった | 13.42±0.78mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準製剤 | 阻止円は認められなかった | 13.14±1.41mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本標準商品分類番号 | 87279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売名 | 和名 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洋名 | Benzethonium Chloride Gargle Liquid 0.2%「KYS」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般名 | ベンゼトニウム塩化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承認番号・年月日 | 21800AMZ10294000・2006年3月15日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯法 | 室温保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | 外箱に表示(3年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬価基準収載年月日 | 2006年 7月7日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売開始年月日 | 2006年10月2日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組成・性状 | 有効成分 | ベンゼトニウム塩化物 | | 薬効薬理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 含量(100g中) | 0.2g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 添加物 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ポリソルベート80、キシリトール、ハッカ油、L-メントール、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、チモール、銅クロロフィリンナトリウム、香料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 性状 | 緑色～濃緑色の液で、芳香がある。振ると強く泡立つ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効能・効果 | 口腔内の消毒、抜歯創の感染予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用法・用量 | 口腔内の消毒には、ベンゼトニウム塩化物として、0.004%(50倍希釈)溶液として洗口する。 抜歯創の感染予防には、ベンゼトニウム塩化物として、0.01%~0.02%(10倍~20倍希釈)溶液として、洗浄する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用上の注意 | <p>1. 重要な基本的注意</p> <p>過敏症状があらわれた場合には投与を中止すること。</p> <p>2. 副作用</p> <p>その他の副作用</p> <p>(1) 過敏症</p> <p>過敏症があらわれることがある。</p> <p>(2) その他</p> <p>ときに(0.1%~5%)刺激感があらわれることがある。</p> <p>3. 適用上の注意</p> <p>(1) 洗口の場合</p> <p>① 用時希釈して使用させること。</p> <p>② 含嗽用のみ使用させること。</p> <p>③ 抜歯後等の口腔創傷の場合、血餅の形成が阻害されると思われる時期には、はげしい洗口を避けさせること。</p> <p>(2) 洗浄の場合</p> <p>① 用時希釈して使用すること。</p> <p>② 洗浄用のみ使用すること。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取扱い上の注意 | <p>1. 直射日光を避け、室温で保管すること。</p> <p>2. 安定性試験⁶⁾</p> <p>最終包装品を用いた長期保存試験(25℃±2℃、60%RH±5%、36ヶ月)の結果、本製剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 包装 | 40mL×30(本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要文献 | <p>1) 第十五改正日本薬局方解説書(廣川書店): C-4040~4043(2006)</p> <p>2) 難波芳道ほか: Nagoya J. Med. Sci. 47, 101~112(1985)</p> <p>3) 橋本良幸: 口腔衛誌 31, 58~71(1981)</p> <p>4) 辻明良他: 感染症誌 53 292~303(1979)</p> <p>5) 社内資料: 円筒平板法による阻止円を指標とした抗菌作用について</p> <p>6) 社内資料: ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」の長期保存試験について</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



患者様向け
使用説明書

包装●1箱: 30本(1本40mL、患者様向け使用説明書)

※掲載情報は、2020年4月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。



販売 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

発売元 昭和薬品化工株式会社
東京都中央区京橋二丁目17番11号

製造販売元 協和新薬株式会社
埼玉県草加市小山1丁目28番8号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286