

ウィル・ステラVジェル

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品



ノータッチ式ディスペンサー

速乾性アルコールジェル専用ディスペンサー

ノータッチで手指衛生

のびが良く、
さらっと
べたつかない

保湿成分
配合※

ディスポーザブル容器で装着も簡単



※グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン

ノンエンベロープウイルスを含む、幅広い微生物に効果的

ウィル・ステラVジェルの各種ウイルスに対する不活化効果 サラヤ(株)バイオケミカル研究所試験結果

	ウイルス	タンパク質負荷	作用時間	減少率(%)
エンベロープなし	ポリオウイルス1型* Poliovirus Type 1	あり	15秒	> 99.99
	アデノウイルス5型* Adenovirus Type 5 / Adenoid 75	なし	15秒	99.96
			30秒	> 99.99
		あり	15秒	99.25
			30秒	> 99.99
	パポウイルスSV 40* Papovavirus SV 40	あり	15秒	> 99.99
エンベロープあり	ネコカリシウイルス F-9※2 (ノロウイルス代替) Feline calicivirus F-9	あり	15秒	> 99.99
	マウスノロウイルス S7※2 (ノロウイルス代替) Murine norovirus S7	あり	15秒	> 99.99
	ワクシニアウイルス* Vaccinia virus, strain Elstree	あり	15秒	> 99.99
	ウシウイルス性下痢ウイルス※3 (HCV代替) Bovine viral diarrhea virus 1 (BVDV)	あり	15秒	> 99.99
	インフルエンザウイルスA(H1N1)型 Influenzavirus Type A (H1N1)	あり	15秒	> 99.99
	ヘルペスウイルス1型 Herpes simplex Type1	あり	15秒	> 99.99

* : DVV & RKIガイドラインにおける「Virucidal activity」の指標ウイルス

※2 ネコカリシウイルス、マウスノロウイルス：ノロウイルスの代替ウイルス ※3 ウシウイルス性下痢ウイルスHCVの代替ウイルス

DVV & RKIガイドラインではそれぞれの指標ウイルスに対して、ウイルス感染価で4.0 Log10以上の減少(感染価の減少率:99.99%以上)が認められた場合、その製剤はウイルスに対して有効であると判定されます。



ジェル状

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品

ウィル・ステラVジェル ディスペンサー用600mL 6個入

内容量●1個=600mL
包装●1箱:6個

※ご使用にはノータッチ式ディスペンサーが必要です。



速乾性アルコールジェル専用ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー UD-9600A セット

サイズ●本体:W142×D101×H248mm
トレーD型:W92×D110×H131mm
包装●1箱:本体、取付板、トレーD型

※単2アルカリ乾電池4本および壁面取り付け用タッピン
ねじ(φ4×25mm)3本は付属していません。
※ウィル・ステラVジェルは別売です。

オプション



ノータッチ式 ディスペンサー用据置台

サイズ●W156×D140×H447mm
包装●1箱:本体、取付板、ねじ

※ウィル・ステラVジェルとノータッチ式
ディスペンサーは別売です。
※組み立て品です。



ノータッチ式 ディスペンサー用スタンド

種類●IS-9000-PHJ
サイズ●W350×D350×H1,310
～1,700mm

包装●1箱:本体、ねじ(2種)、
手指消毒啓発パネル

※ウィル・ステラVジェルとノータッチ式
ディスペンサーは別売です。
※組み立て品です。



ディスペンサー用 スタンド

種類●IS-2020
サイズ●W350×D350×H1,390mm

包装●1箱:本体、ねじ、啓発ラベル

※ウィル・ステラVジェルとノータッチ式
ディスペンサーは別売です。
※組み立て品です。

商品名	ウィル・ステラVジェル	薬効分類番号	2615	製造販売元	サラヤ株式会社			
使用上の注意	してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）							
	次の部位には使用しないこと							
	(1) 損傷のある皮ふ。							
	(2) 目の周囲、粘膜等。							
	相談すること							
使用上の注意	1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること							
	(1) 医師の治療を受けている人。							
	(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。							
	2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること							
	<table><tr><td>関係部位</td><td>症 状</td></tr><tr><td>皮ふ</td><td>発疹・発赤、かゆみ</td></tr></table>					関係部位	症 状	皮ふ
関係部位	症 状							
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ							
効能 又は 効果	手指・皮ふの消毒							
用法 及び 用量	適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。							
用法 及び 用量 に関連する注意	(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 (3) 外用にのみ使用すること。 (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。							
成分 及び 分量	ウィル・ステラVジェルは、有効成分としてエタノール（C ₂ H ₆ O）76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸を含有する。							
保管 及び 取扱い上の 注意	(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。） (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 (5) 火気に近づけないこと。 (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合があるので注意すること。 (8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。							
包 装	600mL							

本製品は一般用医薬品(第3類医薬品)です。

●ご使用の際は、ラベル又は箱記載の説明文書をよくお読みください。

※掲載情報は、2021年2月現在のものです。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **サラヤ株式会社**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支 店


●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRコードでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:11.0以上、Android:8.0以上です。

