

SUNSTAR

医療機関向け

歯周病菌とたたかう

G·U·M[®]

Medical

第3類医薬品

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

G·U·Mメディカル マージナルポイントケアA

Marginal Point Care

歯周病のセルフケアに新提案

新発売

届きにくい患部に薬剤を簡便に塗布できる
塗布用ブラシ付き容器入り歯周病薬



【効能・効果】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むすげゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎



歯周病のセルフケアに、 諸症状の緩和と使いやすさを考えた塗



患者様のセルフケアに

歯周病の治療、および予後管理においては、専門家の定期的な管理に加えて、自宅でのセルフケアが重要です。G・U・Mメディカル マージナルポイントケアAは、そうしたセルフケアのための塗布用ブラシ付き容器入り歯周病薬です。

歯周病の治療・予後管理に

専門家の定期的な管理

+

自宅で行うセルフケア



たとえば、このような患者様に

- 歯周病の初期治療中で、出血・発赤・はれ・痛みがある
- 歯周病安定期治療(SPT)中で、フローピング時などに出血が認められる

「殺菌作用+抗炎症作用+組織修復作用」により 歯周病の諸症状を緩和

3種類の有効成分を配合。

歯肉の出血・はれ・痛みなど歯周病の諸症状を緩和します。

グリチルリチン酸
ニカリウム

0.4%

歯周病の
炎症症状を軽減

セチルピリジニウム
塩化物水和物

0.3%

歯周病の原因菌を殺菌

アラントイン

0.3%

炎症により損傷した
組織の修復を促進

布用ブラシ付き容器入り歯周病薬です。

G・U・Mメディカル マージナルポイントケアA

使いやすさを考えた容器設計*

届きにくい患部に 塗布用ブラシ付き容器を採用



◀ 歯周病の好発部位である臼歯部にも届きやすい、長さ約60mmのロングネックを採用。

▶ 指やハブラシでは届きにくい患部にも薬剤を塗布しやすいコーンカットのシングルタフトタイプのブラシです。



簡便に ダイアル回転で薬剤をブラシに直接吐出



◀ ダイアル(容器尻部)を矢印方向へ回すだけで、先端のブラシ部分に薬剤が吐出されます。

▶ たれずにブラシに保持できる量(約0.03g、米粒大)が1歯分の塗布量です。1回の最大塗布量はおおよそ10塗布分(約0.3g)です。




使用例 (内容量4g≒約120歯分)：上顎臼歯部 6 7 への塗布×朝晩2回の場合⇒約1か月分

届きにくい患部にも、簡便に薬剤を塗布できるので、
歯科指導に則したセルフケアが期待できます

参考資料

岡山大学病院に来院したSPT期の患者(n=61)を対象に、本製品を3か月間使用した後のアンケート調査を実施したところ、下の図に示した良好な結果を得ることができました。



出典：犬伏 順也ほか：第53回春季日本歯周病学会学術大会講演抄録集 p.122, 2010

* 本品はハミガキではありません。日常お使いのハブラシでブラッシング後、本品を患部に塗布してください。また、本品をハブラシとして使用しないでください。

G・U・Mメディカル マージナルポイントケアA

使い方

- 1 キャップを外し、容器先端のブラシ部分を下に向け、容器尻部を時計まわりに回して薬剤を米粒大程度(約0.03g)出し、はれ、出血、痛みなどの症状のある患部に塗布します。
- 2 ①を繰り返し、同じように症状のある歯肉、歯と歯肉の境目などに塗布していきます。
1回に使用する最大塗布量の目安は、繰り返し塗布10回程度です。
- 3 使用後は、容器先端のブラシ部分を流水で洗い、水をよく切った後、キャップをして保管してください。



製品情報

【効能・効果】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)：1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)をブラシなどにとり、歯肉に塗り込む。

口内炎：1日2～4回、適量を患部に塗る。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)歯科用におのみ使用してください。
- (3)米粒大約10塗布分(約0.3g)が1回の最大使用量です。過剰に使用しないでください。

【成分・分量】

成分(1g中)	添加物として、濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、 <i>l</i> -メントール、水酸化ナトリウムを含有します。
グリデルリチン酸ナトリウム	4mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg
アラントイン	3mg

△ 使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) しばらく使用しても症状がよくなる場合

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



SUNSTAR

GUM
MEDICAL
Medical

G・U・Mメディカル マージナルポイントケアA

G・U・M Medical Marginal-Pointcare A

containing Dioxidin Glycibismate,

Cetylpyridinium Chloride and Allantoin.

第3類医薬品

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

G・U・Mメディカル マージナルポイントケアA

内容量 4g

医薬品についてのお問い合わせ
医薬品インフォメーションセンター

TEL 072-682-4815

受付時間/月～金9:00～17:00
(土・日・祝日は休業いたします。)